Omotetia e inversione nei problemi olimpici

Rosanna Tupitti

Liceo Scientifico A. Einstein, Teramo

e-mail: rosannatupitti@gmail.com

Montecatini, 15-18 ottobre 2017

Sommario

Questo intervento è collegato a quello di Cetraro 2016. Ho voluto fare una panoramica sulle trasformazioni geometriche e il loro utilizzo nella risoluzione di problemi. L'anno scorso ho trattato traslazione, simmetria e rotazione, quest'anno omotetia e inversione.

1 Omotetia

Definizione. Sia O un punto del piano e k un numero reale non nullo. Una **omotetia** è una trasformazione geometrica piana che manda il punto P nel punto P' tale che $\overrightarrow{OP'} = k \cdot \overrightarrow{OP}$.

O e k sono detti, rispettivamente, il **centro** e il **rapporto** di omotetia.

Essa si indica con $h_O = \mathcal{H}(O, k)$.

Principali proprietà:

- $A'B'/AB = |k|$;
- $AB \parallel A'B'$;
- le *rette unite* di un'omotetia sono tutte e sole quelle passanti per il centro;
- se due triangoli non congruenti hanno i lati orientati tali che ciascun lato dell'uno è parallelo al corrispondente lato dell'altro allora esiste una omotetia che manda un triangolo nell'altro;
- un'omotetia trasforma cerchi in cerchi;
- la composizione di due omotetie con lo stesso centro e rapporti k_1 e k_2 è un'omotetia con lo stesso centro e di rapporto il prodotto $k_1 \cdot k_2$;
- la composizione di due omotetie con centri diversi e rapporti k_1 e k_2 con $k_1 \cdot k_2 \neq 1$ è una omotetia con centro sulla retta passante per i due centri e rapporto $k_1 \cdot k_2$; se $k_1 \cdot k_2 = 1$ allora la composizione è una traslazione.

Problemi risolti

1. Esternamente al quadrato $ABCD$ costruire il triangolo $\triangle DCE$ retto in E . Indichiamo con M ed N i punti di intersezione di DC con AE e BE rispettivamente. Se $DM = 20$ e $NC = 45$ calcolare MN .

Soluzione.

- Consideriamo l'omotetia h_E di centro E tale che $A \rightarrow M$, $B \rightarrow N$, $C \rightarrow C'$, $D \rightarrow D'$ con $D' \in DE$ e $C' \in CE$;
- osserviamo che poichè un'omotetia manda quadrati in quadrati $D'MNC'$ è un quadrato di lato x ;
- inoltre h_E trasforma segmenti congruenti in segmenti congruenti per cui $D'M = MN$. Pertanto $MNC'D'$ è un quadrato.
- essendo $\angle DEC = 90^\circ$ e $\triangle DMD' \sim \triangle NCC'$, posto $MN = x$ abbiamo:

$$\begin{aligned} DM : NC' &= MD' : NC \Leftrightarrow \\ 20 : x &= x : 45 \Leftrightarrow x = 30 \end{aligned}$$

□

2. In un triangolo rettangolo $\triangle ABC$, con $\angle A = 90^\circ$ e $\angle C = 60^\circ$ inscrivere il quadrato $PQMN$ con $P, Q \in BC$, $M \in AC$ ed $N \in AB$. Sia $O = BM \cap CN$ tale che la distanza tra O e BC vale 10. Calcolare la distanza di O da AB .

Soluzione.

- L'omotetia h_B di centro B tale che $M \rightarrow O$, porta P in P' ed N in N' e, per le proprietà delle omotetie $P'Q'ON'$ è un quadrato;
- essendo $N'O \parallel BC$ abbiamo che $\angle ON'H = 30^\circ$;
- poichè $N'O = OQ' = 10$ risulta che $HO = N'O/2 = 5$.

□

3. Provare che in ogni trapezio i punti medi delle basi, il punto d'intersezione delle diagonali e il punto d'intersezione dei due lati non paralleli sono allineati.

Soluzione.

- L'omotetia h_F di centro F tale che $D \rightarrow A$, trasforma C in B (poichè le rette vengono trasformate in rette parallele) e trasforma il punto medio di DC nel punto medio di AB , per cui $N \rightarrow M$ e dunque $F \in NM$;
- dobbiamo ora provare che anche $E \in MN$: per fare ciò consideriamo l'omotetia h_E di centro E tale $A \rightarrow C$;
- h_E trasforma B in D ed M in N e ciò garantisce che $E \in NM$;
- pertanto F, N, E, M sono allineati.

□

4. In un triangolo $\triangle ABC$ è inscritta una circonferenza γ . Sia r la retta parallela ad AB e tangente a γ in M . La retta CM incontra AB in N . Se $AC = 9$, $BC = 7$ e $AB = 6$ calcolare AN .

Soluzione. Siano $E = AC \cap r$, $F = BC \cap r$; indichiamo con γ' la circonferenza inscritta in $\triangle EFC$ e siano $P = \gamma' \cap EF$, $T = \gamma' \cap EC$, $V = \gamma' \cap FC$, $R = \gamma \cap AC$, $S = \gamma \cap BC$, $Q = \gamma \cap AB$, $EM = a$, $MP = b$, $PF = c$, $TC = d$.

- Consideriamo l'omotetia h_C di centro C tale che $E \rightarrow A$, $F \rightarrow B$; per le proprietà delle omotetie $h_C(\omega) = \gamma$ e dunque $T \rightarrow R$ e $V \rightarrow S$;
- poichè $CR = CS$ abbiamo:

$$a + a + b + d = d + c + c + b \Rightarrow a = c \Rightarrow EM = PF$$

- poichè segmenti congruenti hanno come immagine segmenti congruenti abbiamo

$$AN = h_C(EM) = h_C(PF) = QB$$

- dunque per valutare AN è sufficiente valutare QB . A tal fine posto $BQ = x$, $AQ = y$ e $CR = z$ abbiamo

$$\begin{cases} x + y + z = 11 \\ y + z = 9 \\ x + z = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \\ z = 5 \end{cases} \Rightarrow \therefore AN = QB = x = 2$$

□

5. Sia γ una circonferenza di diametro AB , sia T un punto esterno a γ , siano TQ e TP i segmenti di tangenza e sia r la retta tangente a γ nel punto B . Detti M , S ed N i punti di intersezione della retta r con AP , AT e AQ rispettivamente, dimostrare che S è il punto medio del segmento MN .

Soluzione.

- Consideriamo l'omotetia h_A di centro A tale che $T \rightarrow S$;
- osserviamo che $Q \rightarrow Q'$ e $P \rightarrow P'$ con la proprietà che $SQ' \parallel TQ$ e $P'S \parallel PT$;
- essendo $TQ = TP$ abbiamo $SQ' = SP'$ (1)
- dalle proprietà delle omotetie e dei triangoli rettangoli abbiamo:

$$\angle P'MS = \angle PMB = \angle PBA = \angle TPA = \angle SP'M \Rightarrow MS = SP' \quad (2)$$

- analogamente abbiamo:

$$\angle Q'NS = \angle QBA = \angle XQA = \angle TQN = \angle SQ'N \Rightarrow SQ' = SN \quad (3)$$

- da (1), (2) e (3) deduciamo che: $MS = SP' = SQ' = SN$.

□

2 Inversione circolare

Definizione. Data una circonferenza γ di centro O e raggio k si dice **inversione** la trasformazione geometrica piana che ad ogni punto $P \neq O$ associa il punto P' della semiretta OP tale che

$$OP \cdot OP' = k^2$$

La circonferenza γ è chiamata circonferenza di inversione mentre O e k^2 sono rispettivamente il **centro** e la **potenza dell'inversione**: essa è indicata con $\mathbf{I} = I(O, k^2)$.

L'insieme di tutti i punti nei quali si trasformano i punti di una figura $\mathcal{F}$ per mezzo di un'inversione costituisce la figura $\mathcal{F}'$ detta *figura inversa* di $\mathcal{F}$.

2.1 Inversione in coordinate cartesiane.

Siano x ed y coordinate nel piano messe in modo tale che il punto O coincida con l'origine del sistema di riferimento. Allora l'inversione $I(O, k^2)$ si può rappresentare nella forma $I(x, y) = (X, Y)$, dove:

$$\begin{cases} X = \frac{k^2 x}{x^2 + y^2} \\ Y = \frac{k^2 y}{x^2 + y^2} \end{cases}$$

2.2 Proprietà dell'inversione.

Un'inversione $\mathbf{I} = I(O, k^2)$ di centro O e potenza k^2 soddisfa le seguenti proprietà:

- $\mathbf{I}$ è una trasformazione involutoria, cioè $\mathbf{I} \circ \mathbf{I}$ è l'identità;
- se P è un punto esterno a γ e T_1, T_2 sono i punti di contatto delle tangenti a γ condotte da P allora $P' = T_1 T_2 \cap OP$;

- se P è un punto interno a γ e T è uno dei punti di intersezione di γ con la perpendicolare a PO passante per P , allora la tangente a γ in T interseca PO in P' ;

- I lascia fissi tutti i punti di γ ;
- I lascia fisse le rette passanti per O ;
- se $A' = I(A)$ e $B' = I(B)$ allora $\triangle OAB \sim \triangle OB'A'$ ed il quadrilatero $ABB'A'$ è ciclico;

- $I = I(O, k^2)$ trasforma una circonferenza di centro O e raggio r in una circonferenza di centro O e raggio $r' = k^2/r$;
- I trasforma ogni retta non passante per O in una circonferenza passante per O . Inoltre il suo diametro passante per O è perpendicolare alla retta data;

- I trasforma una circonferenza ω passante per O in una retta non passante per O . Inoltre questa retta è perpendicolare al diametro di ω passante per O ;
- I trasforma una circonferenza ω non passante per O in una circonferenza non passante per O ;

- I lascia fisse tutte le circonferenze ortogonali ad γ ;
- se $A' = I(A)$ e $B' = I(B)$ allora

$$A'B' = \frac{k^2 \cdot AB}{OA \cdot OB}$$

- la trasformata di una circonferenza ω di raggio r è una circonferenza ω' di raggio r' tale che

$$r' = \frac{k^2}{\text{Pow}(O, \omega)} \cdot r$$

dove $\text{Pow}(O, \omega) = OC^2 - r^2$ è la potenza di O rispetto al cerchio ω di centro C ;

- I è un'applicazione *conforme* (inversa), ossia conserva gli angoli tra due figure¹ ma ne cambia l'*orientazione*: se $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ sono due figure (linee, circonferenze), allora

$$\angle(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2) = \angle(I(\mathcal{F}_1), I(\mathcal{F}_2))$$

¹Ricordiamo che per angolo formato da due curve in un punto comune si intende l'angolo formato dalle tangenti alle due curve in tale un punto.

Problemi risolti

1. Due cerchi ω_1 e ω_2 sono tangenti esternamente nel punto K ; essi sono anche tangenti internamente a un cerchio Ω nei punti A_1 e A_2 rispettivamente. Sia P uno dei punti di intersezione di Ω con la tangente comune a ω_1 e ω_2 nel punto K . La retta PA_1 interseca ω_1 ulteriormente in B_1 e la retta PA_2 interseca ω_2 ulteriormente in B_2 . Dimostrare che B_1B_2 è una tangente comune ad ω_1 e ω_2 . **(British MO 1996)**

Soluzione.

Osservato che la retta PK è la tangente comune a ω_1 e ω_2 abbiamo

$$PK^2 = PB_1 \cdot PA_1 = PB_2 \cdot PA_2 \quad (1)$$

Pertanto consideriamo l'inversione $\mathbf{I} = I(P, PK^2)$

- le circonferenze ω_1 e ω_2 sono lasciate fisse da $\mathbf{I}$ essendo entrambe ortogonali alla circonferenza di inversione;
- $A_1 \rightarrow B_1$, $A_2 \rightarrow B_2$ per la (1);
- $\Omega \rightarrow \ell$ (retta passante per B_1 e B_2);
- dato che l'inversione conserva i punti di tangenza B_1 dovrà essere il punto di tangenza tra ω_1 ed ℓ in quanto A_1 è il punto di tangenza tra Ω ed ω_1 ; analogamente B_2 sarà il punto di tangenza tra ω_2 ed ℓ in quanto A_2 è il punto di tangenza tra Ω ed ω_2 ; dunque la retta B_1B_2 è la tangente comune ad ω_1 e ω_2 .

□

2. Sia dato un semicerchio Ω di centro O e diametro AB e sia C un arbitrario punto del segmento OB . Sia D il punto del semicerchio tale che CD è perpendicolare ad AB . Un cerchio ω con centro P è tangente all'arco BD in F e ai segmenti CD , AB in E , G rispettivamente. Dimostrare che il triangolo ADG è isoscele.

(Cesenatico 2003)

Soluzione. Indichiamo con γ la circonferenza di centro A e raggio AD .

Considerata l'inversione $\mathbf{I} = I(A, AD^2)$ abbiamo

- $\mathbf{I}(AB) = AB$ perchè le rette per il centro di inversione restano fisse;
- $\mathbf{I}(B) = C$ per il primo teorema di Euclide, $\mathbf{I}(D) = D$ perchè $D \in \gamma$, quindi $\mathbf{I}(\Omega)$ è contenuta nella retta CD (in particolare l'arco BD ha per immagine il segmento CD e viceversa);
- la circonferenza ω è tangente a DC , ad AB e all'arco $\widehat{DB}$, dunque $\mathbf{I}(\omega)$ è tangente all'arco $\widehat{DB}$, alla retta AB e al segmento DC ; ma una siffatta circonferenza è unica per cui $\mathbf{I}(\omega) = \omega$ (osserviamo, tra l'altro, che i punti A , E ed F sono allineati);
- valutiamo $\mathbf{I}(G)$: $\mathbf{I}(G) \in AB$ ed $\mathbf{I}(G) \in \omega$ per cui $\mathbf{I}(G)$ coincide con G ;
- essendo G un punto fisso $G \in \gamma$ ossia $AG = AD$.

□

3. Il quadrilatero $ABCD$ è inscritto in una circonferenza di centro O . Le diagonali AC e BD non passano per O . Se il centro P della circonferenza ω_1 circoscritta ad $\triangle AOC$ giace sulla retta BD , dimostrare che il centro Q della circonferenza ω_2 circoscritta a $\triangle BOD$ giace sulla retta AC .

Soluzione.

Consideriamo l'inversione $I = I(O, OA^2)$.

- I trasforma la circonferenza ω_1 nella retta AC e la retta BD nella circonferenza ω_2 ;
- osserviamo che la retta BD e la circonferenza ω_1 sono ortogonali (una retta è ortogonale a una circonferenza se e solo se passa per il suo centro), per cui lo sono anche le rispettive immagini;
- pertanto essendo ortogonali AC ed ω_2 abbiamo che $Q \in AC$.

□

4. Sia ABC un triangolo con $\angle BAC = 90^\circ$ e sia L un punto del segmento BC . Le circonferenze $\omega_1 = \odot(ABL)$, $\omega_2 = \odot(CAL)$ intersecano le rette AC , AB in M ed N rispettivamente (oltre che in A). Dimostrare che i punti L, M ed N sono allineati. **(British MO 2010)**

Soluzione.

- Indichiamo con P e Q i centri di ω_1 e ω_2 rispettivamente.
- Le circonferenze ω_1 e ω_2 sono ortogonali: infatti dato che $\triangle ABC$ è rettangolo in A

$$\begin{aligned} \angle PAQ &= \angle PAL + \angle LAQ = 90^\circ - \frac{\angle LPA}{2} + 90^\circ - \frac{\angle AQL}{2} \\ &= 90^\circ - \angle CBA + 90^\circ - \angle ACB = 90^\circ \end{aligned}$$

da cui segue $AP \perp AQ$ e ciò garantisce l'ortogonalità delle due circonferenze.

- per provare che L, M ed N sono allineati basta trovare un'inversione che porta tali punti su una circonferenza passante per il suo centro; a tal fine scegliamo l'inversione $\mathbf{I} = I(A, AM^2)$ (in realtà il raggio può essere scelto a piacere).
- osserviamo che $\mathbf{I}(M) = M$ e poniamo $\mathbf{I}(L) = L'$, $\mathbf{I}(N) = N'$. Poichè $A \in \omega_1$ si ha che $\mathbf{I}(\omega_1)$ è una retta, e sapendo che $M, L \in \omega_1$ possiamo dedurre che $\mathbf{I}(\omega_1) = ML'$. Analogamente $\mathbf{I}(\omega_2) = L'N'$.
- poichè l'inversione conserva gli angoli e ω_1 è ortogonale ad ω_2 possiamo dedurre che $L'M \perp L'N'$, quindi $\angle ML'N' = 90^\circ$. Dato che ovviamente $\angle MAN' = 90^\circ$ i punti L', M, N', A sono conciclici.
- in conclusione L', M, N' giacciono su una circonferenza passante per A (centro di inversione) e ciò prova l'allineamento di L, M, N .

□

5. Sia $\triangle ABC$ un triangolo e $D \in BC$. Le circonferenze ω_1 e ω_2 sono tangenti esternamente ad AD nel medesimo punto M e ciascuna di esse è tangente alla circonferenza Ω circoscritta ad $\triangle ABC$ e al lato BC , la prima, nel punto P , sopra al segmento BD e l'altra, nel punto Q , sopra al segmento DC . Dimostrare che M è l'incentro del triangolo $\triangle ABC$. (Romania MO 1997)

Soluzione.

- Indichiamo con N il punto medio dell'arco BC che non contiene A e consideriamo l'inversione $\mathbf{I} = \mathbf{I}(N, NB^2)$: osserviamo che $\mathbf{I}(\Omega) = BC$ e viceversa; inoltre poichè punti di tangenza si trasformano in punti di tangenza, si ha $\mathbf{I}(E) = P$ e $\mathbf{I}(P) = E$; analogamente $\mathbf{I}(Q) = F$ e $\mathbf{I}(F) = Q$. Possiamo quindi dire che

$$NP \cdot NE = NQ \cdot NF = NB^2$$

- $\mathbf{I}(\omega_1)$ è una circonferenza tangente a BC in P e ad Ω in E : una siffatta circonferenza è univocamente determinata per cui $\mathbf{I}(\omega_1) = \omega_1$; analogamente $\mathbf{I}(\omega_2) = \omega_2$;
- poichè il punto di tangenza di due circonferenze fisse non può che essere lasciato fisso abbiamo $\mathbf{I}(M) = M$, ossia $NM^2 = NB^2$;
- deduciamo allora che $NM^2 = NP \cdot NE = NQ \cdot NF$; ciò prova che N appartiene ad AM , tangente comune alle due circonferenze ω_1 e ω_2 ; dunque AM , passando per il punto medio dell'arco BC è bisettrice dell'angolo $\angle BAC$;
- per dimostrare che M è l'incentro del triangolo $\triangle ABC$ basta provare che BM è la bisettrice dell'angolo $\angle CBA$: posto $\alpha = \angle CBN$, $\beta = \angle CBM$ risulta $\angle BMN = \alpha + \beta$ e $\angle BAN = \alpha$; per il teorema dell'angolo esterno deve essere $\angle ABM = \beta$ da cui segue che $\angle CBM = \angle MBA$, quindi BM è la bisettrice dell'angolo $\angle CBA$.

□

6. Sia ABC un triangolo acutangolo e siano D, E, F i piedi delle altezze relative ai lati BC, CA, AB rispettivamente. Dimostrare che le perpendicolari condotte da A, B, C rispettivamente su EF, FD, DE sono concorrenti.

Soluzione. Indichiamo con O ed H il circocentro e l'ortocentro di $\triangle ABC$ rispettivamente e con Ω la circonferenza circoscritta.

Per provare la tesi è sufficiente dimostrare che $AO \perp EF$.

- Osserviamo che $BDHF$ e $DCEH$ sono quadrilateri ciclici per cui:

$$AB \cdot AF = AH \cdot AD = AC \cdot AE$$

- se consideriamo l'inversione $\mathbf{I} = I(A, AH \cdot AD)$ si ha: $\mathbf{I}(B) = F$, $\mathbf{I}(C) = E$ ed $\mathbf{I}(AO) = AO$; poichè $A \in \Omega$ ne segue che $\mathbf{I}(\Omega)$ è una retta, per cui $\mathbf{I}(\Omega) = FE$;
- osservato che la circonferenza Ω è ortogonale alla retta AO abbiamo che $\mathbf{I}(\Omega)$ è ortogonale a $\mathbf{I}(AO)$ cioè $FE \perp AO$, in quanto l'inversione conserva gli angoli;
- in modo analogo si prova che $BO \perp FD$ e $CO \perp DE$ e ciò garantisce che EF, FD, DE sono concorrenti in O .

□

7. In un triangolo $\triangle ABC$, sia H l'ortocentro, sia M il punto medio di BC e sia K la proiezione ortogonale di H su AM . Se N è il simmetrico di K rispetto a BC , dimostrare che N giace sulla circonferenza Ω circoscritta ad $\triangle ABC$.

Soluzione.

- Essendo N il simmetrico di K rispetto a BC abbiamo $\angle CNB = \angle BKC$ quindi per provare la tesi basta dimostrare che $\angle BKC$ è supplementare di $\alpha = \angle BAC$.
- Per fare questo usiamo le seguenti considerazioni:
 - (1) $AFHE$ è ciclico $\Rightarrow \angle EHF$ è supplementare di α ;
 - (2) $FBDH$ è ciclico $\Rightarrow AF \cdot AB = AH \cdot AD$;
 - (3) $HDCE$ è ciclico $\Rightarrow AE \cdot AC = AH \cdot AD$;
 - (4) $HDMK$ è ciclico $\Rightarrow AK \cdot AM = AH \cdot AD$;
- se consideriamo l'inversione $\mathbf{I} = I(A, AH \cdot AD)$ abbiamo: $F \rightarrow B, D \rightarrow H, M \rightarrow K, E \rightarrow C$; inoltre $\mathbf{I}$ trasforma la circonferenza ω dei nove punti (che passa per F, D, M, E) nella circonferenza $\mathbf{I}(\omega)$ che passa per B, H, K, C ;
- essendo B, H, K, C conciclici deduciamo che $\angle BKC = \angle BHC$;
- in conclusione

$$\angle CNB = \angle BKC = \angle BHC = \angle EHF = 180^\circ - \alpha$$

per cui $\angle CNB$ è supplementare di $\angle BAC$ e ciò garantisce che $N \in \Omega$.

□

8. Sia X un punto interno al triangolo $\triangle ABC$ e sia $Y = AX \cap BC$. Tracciamo le perpendicolari YP, YQ, YR, YS alle rette CA, CX, BX, BA rispettivamente. Trovare la condizione necessaria e sufficiente che deve soddisfare X affinché $PQRS$ sia un quadrilatero ciclico.

(Iran MO 2004)

Soluzione. Indichiamo con ω_1 la circonferenza di diametro BY , con ω_2 quella di diametro YC . Osservato che $RYQX$ ed $SYPA$ sono quadrilateri ciclici, denotiamo con ω_3 e ω_4 le rispettive circonferenze circoscritte.

- Considerata un'inversione I di centro Y e potenza k^2 poniamo $I(P) = P', I(Q) = Q', I(R) = R', I(S) = S'$ e osserviamo che $I(BC) = BC$;
- poichè $I(\omega_1)$ e $I(\omega_2)$ sono ortogonali a BC anche $I(\omega_1) = S'R', I(\omega_2) = P'Q'$ sono ortogonali a BC e quindi parallele tra loro;
- analogamente $I(\omega_3) = R'Q'$ e $I(\omega_4) = S'P'$ sono rette ortogonali ad AY e dunque parallele tra loro;
- $\therefore P'Q'R'S'$ è un parallelogramma che è ciclico se e solo se è un rettangolo;
- poichè l'inversione conserva gli angoli abbiamo che $\angle P'S'R'$ è uguale all'angolo formato dalle circonferenze ω_1 e ω_4 ; pertanto le due circonferenze sono ortogonali se e solo se $AY \perp BC$;
- in conclusione $PQRS$ è ciclico $\Leftrightarrow P'Q'R'S'$ è ciclico $\Leftrightarrow \angle P'S'R' = 90^\circ \Leftrightarrow AY \perp BC$.

Osservazione. Se la circonferenza circoscritta a $P'Q'R'S'$ passa per Y si ha un caso degenero e i punti P, Q, R, S sono allineati. $\square$

Problemi proposti

- La circonferenza passante per i punti medi dei lati di un triangolo $\triangle ABC$ passa anche per i piedi delle altezze e per i punti medi dei segmenti che uniscono l'ortocentro ai vertici. Tale circonferenza si chiama *circonferenza dei nove punti* e il suo centro è indicato con N . Provare che:
 - i punti O (circocentro), G (baricentro), H (ortocentro) sono allineati (*retta di Eulero*);
 - N è il punto medio di OH ;
 - il raggio della circonferenza dei nove punti è $R/2$, avendo indicato con R il raggio della circonferenza circoscritta ad $\triangle ABC$.
- Inscrivere un quadrato in un triangolo.
- Nel triangolo $\triangle ABC$ siano A' , B' , C' i punti medi dei lati BC , CA , AB rispettivamente. Sia I l'incentro di ABC , sia G il suo baricentro ed S (*centro di Spieker*) il centro della circonferenza inscritta nel triangolo mediale $\triangle A'B'C'$. Dimostrare che S , G , I sono allineati e $IG = 2 \cdot GS$.
- Due circonferenze sono tangenti internamente nel punto A . La corda MN della circonferenza più grande è tangente alla circonferenza più piccola nel punto P . Provare che la retta AP è la bisettrice dell'angolo $\angle MAN$.
- Sia $ABCD$ un trapezio con $AB \parallel DC$, sia M il punto medio di DC e sia P un punto sulla retta BC . Sia $X = AP \cap DC$, $Q = PM \cap BD$ e $Y = AQ \cap DC$. Dimostrare che M è il punto medio di XY .
- Siano ω_1 e ω_2 due circonferenze tangenti esternamente nel punto A . Sia M il punto di intersezione delle due tangenti esterne. Siano B , C , D , E i punti di intersezione di ω_1 e ω_2 con una semiretta s passante per M (come indicato in figura). Provare che $\angle BAD = 90^\circ$,

7. Sia ABC un triangolo rettangolo ($\angle ACB = \frac{\pi}{2}$). Sia H la proiezione di C su AB . Un cerchio di centro C passante per H interseca la circonferenza circoscritta ad ABC in E ed F . Dimostrare che EF biseca il segmento CH .
8. Sia AB un diametro del cerchio Ω . Per un punto $C \in \Omega$, $C \neq A$, $C \neq B$ denotiamo con D la sua proiezione su AB . Sia ω la circonferenza tangente ad AD , CD e Ω e siano $X = \Omega \cap \omega$ e $R = AD \cap \omega$. Dimostrare che $BA \cdot BD = BR^2$.
9. Dimostrare che i punti P , Q , R della seguente figura sono allineati.

10. Sia I l'incentro di ABC ($AB < BC$), sia M il punto medio di AC , sia N il punto medio dell'arco AC della circonferenza circoscritta, che contiene B . Dimostrare che $\angle IMA = \angle INB$.
11. (TEOREMA DI TOLOMEO) Sia $ABCD$ un quadrilatero ciclico. Dimostrare che

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$$

12. Sia ABC un triangolo acutangolo e siano D , E , F i piedi delle altezze relative ai lati BC , CA , AB rispettivamente. Uno dei punti di intersezione tra EF e la circonferenza circoscritta ad $\triangle ABC$ è P . Se $Q = DF \cap BP$ dimostrare che $AP = AQ$. (**British MO FST 2011**)
13. Siano k e k' due circonferenze concentriche di centro O e raggi rispettivamente R ed R' (con $R < R'$). Una semiretta Ox interseca k nel punto A ; la semiretta opposta Ox' interseca k' nel punto B . Una terza semiretta Ot , distinta dalle precedenti, interseca k in E e k' in F . Dimostrare che le quattro circonferenze seguenti passano per un stesso punto:
- (1) la circonferenza circoscritta al triangolo $\triangle OAE$;
 - (2) la circonferenza circoscritta al triangolo $\triangle OBF$;
 - (3) la circonferenza di diametro EF ;
 - (4) la circonferenza di diametro AB .
- (**Mediterranean MC 2005**)

14. (TEOREMA DELLE SETTE CIRCONFERENZE). Le circonferenze $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$ sono tangenti a una circonferenza ω nei punti $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ rispettivamente e ciascuna di esse è anche tangente alla precedente e alla seguente (intendiamo che ω_1 è la seguente di ω_6 e che ω_6 è la precedente di ω_1). Dimostrare che le rette A_1A_4, A_2A_5, A_3A_6 sono concorrenti.

Riferimenti bibliografici

- [1] Massimo Gobbino, *Schede olimpiche*, U.M.I, Bologna (2010)
- [2] Italo D'Ignazio, Ercole Suppa *Il problema geometrico, dal compasso al Cabri*, Interlinea Editrice (2001)
- [3] Arkadii Slinko, *Transformations in the solutions of geometric problems*
<http://www.mathsolympiad.org.nz/category/notes/geometry/>
- [4] Bobby Poon, *Geometry Transformations*, IMOHK Training 2006
- [5] Clayton W. Dodge, *Euclidean Geometry and Transformations*, Dover Publications, New York 2004
- [6] I.M. Yaglom, *Geometric Transformations IV*, Anneli Lax New Mathematical Library MAA, 2009
- [7] F.J.G. Capitan, *Inversión en Olimpiadas*,
<http://www.oei.es/historico/oim/numero27/probinv.pdf>
- [8] Dušan Djukić, *Inversion*,
<http://imomath.com/index.php?options323=>